

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 1 060 739 A1**

(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
20.12.2000 Bulletin 2000/51

(51) Int Cl.7: **A61K 7/48**(21) Numéro de dépôt: **00480049.6**(22) Date de dépôt: **06.06.2000**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Inventeur: **Seguin, Marie-Christine  
MC 98000 (MC)**

(74) Mandataire: **Bonneau, Gérard  
Cabinet Bonneau,  
Conseil en Propriété Industrielle,  
La Taissounières HB3  
1681, Route des Dolines  
06560 Sophia Antopolis (FR)**


(30) Priorité: **16.06.1999 FR 9907631**

(71) Demandeur: **EXSYMOL S.A.M.  
MC-98000 Monte Carlo (MC)**

(54) **Composition cosmétique amincissante à base de L-arginine ou d'un de ses dérivés**

(57) L'invention concerne une composition cosmétique pour l'amincissement à base de L-arginine, d'un analogue de L-arginine ou d'un de leurs dérivés, applicable par voie topique.

Cette composition est caractérisée en ce qu'elle comprend, en association avec tout excipient cosmétiquement approprié, au moins un composé qui est la L-arginine, un analogue de L-arginine ou un de leurs dérivés ou l'un quelconque de leurs sels, ledit composé ayant la formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

R<sub>1</sub> représente un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un radical acyle, acyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction α-aminée libre, lié par une liaison peptidique,

R<sub>2</sub> représente un groupement hydroxyle, un radical alcoxy, amine, alkylamine, un groupement silyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction α-carboxylique, lié par une liaison peptidique,

et n = 3 ou 4

**EP 1 060 739 A1**

**Description****Domaine technique :**

5 **[0001]** La présente invention concerne une nouvelle composition cosmétique pour l'amaigrissement à base de L-arginine, d'un analogue de L-arginine, ou d'un de leurs dérivés, se présentant sous une forme applicable par voie topique.

**Etat de la technique :**

10 **[0002]** L'industrie cosmétique est en permanence à la recherche de nouveaux actifs toujours plus performants et réellement efficaces pour lutter contre les surcharges adipeuses localisées.

Le tissu adipeux est constitué essentiellement d'adipocytes, cellules métaboliquement très actives assurant le maintien de l'équilibre énergétique au sein de l'organisme grâce à deux voies métaboliques antagonistes :

- 15
- la lipogenèse c'est à dire la biosynthèse, à partir de glucose et d'acides gras, de triglycérides stockés ensuite au sein des adipocytes
  - la lipolyse qui consiste en l'hydrolyse des triglycérides en glycérol et acides gras libres.

20 **[0003]** Parmi les produits cosmétiques amaigrissants proposés dans le commerce, on trouve des compositions agissant par inhibition de la lipogenèse qui contiennent des inhibiteurs de la captation ou de la fixation du glucose nécessaire à la synthèse des triglycérides.

**[0004]** D'autres produits amaigrissants visent à favoriser la lipolyse en intervenant sur le taux d'AMPc qui stimule la lipase permettant l'hydrolyse des triglycérides ; la plupart de ces produits contiennent des bases xanthiques, particulièrement la caféine, souvent associées à des extraits végétaux pouvant renforcer leur activité.

25 Certains produits contiennent aussi des actifs agissant sur les récepteurs adrénergiques  $\alpha$  et  $\beta$  qui inhibent et stimulent respectivement la lipolyse.

On a également mis en évidence l'influence des hormones sexuelles et des catécholamines sur les récepteurs  $\beta$ , mais leur usage est interdit en cosmétique.

30 **[0005]** Des progrès récents dans la compréhension des mécanismes de régulation de l'adipocyte permettent d'envisager de nouvelles stratégies cosmétiques pour des produits amaigrissants à application topique.

La nouvelle approche proposée dans ce brevet est l'utilisation d'un actif lipolytique topique agissant sur l'adipocyte par libération d'un médiateur cellulaire.

35 **[0006]** Une équipe de chercheurs a récemment identifié un régulateur potentiel de la lipolyse : le radical monoxyde d'azote ( $\text{NO}^\bullet$ ) ou une forme redox associée (Modulation of White Adipose Tissue Lipolysis by Nitric Oxide, Gaudiot et Coll., J. Biol.Chem., 1998, 273, 13475-13481).

Il résulte de ces travaux que le radical  $\text{NO}^\bullet$  peut, dans un environnement redox approprié, fonctionner comme un facteur de stimulation de la lipolyse.

40 **[0007]** Cependant, l'utilisation du monoxyde d'azote ou d'un donneur de  $\text{NO}^\bullet$  n'est pas compatible avec une utilisation cosmétique.

En effet, le monoxyde d'azote a des propriétés physiologiques multiples car c'est un médiateur cellulaire agissant notamment au niveau des systèmes vasculaire et neuronal.

45 **[0008]**  $\text{NO}^\bullet$  est également une toxine cellulaire potentielle impliquée dans la réponse immunitaire. Au niveau de la peau,  $\text{NO}^\bullet$  participe à la réponse inflammatoire (notamment lors d'un stress photo-induit), module l'activité mélanocytaire, ou la prolifération cellulaire lors du processus de cicatrisation.

De plus, dans certaines conditions, le monoxyde d'azote peut générer *in vivo* des sous produits toxiques tels que l'anion peroxy-nitreux.

**Exposé de l'invention :**

50 **[0009]** C'est pourquoi, un des buts de la présente invention est de résoudre une partie des problèmes évoqués ci-dessus en proposant une composition cosmétique pour l'amaigrissement contenant un actif cosmétique susceptible de générer le monoxyde d'azote de façon endogène.

55 **[0010]** La L-arginine est le substrat naturel de la NO-synthase, enzyme qui métabolise l'arginine pour libérer le monoxyde d'azote.

Cette enzyme est présente naturellement au sein du tissu adipeux et permet de maintenir un taux basal de  $\text{NO}^\bullet$ .

**[0011]** Il a été prouvé qu'un apport extracellulaire de L-arginine entraînait une production de  $\text{NO}^\bullet$ .

Bien que cette enzyme soit très spécifique, il a été démontré récemment qu'elle pouvait accepter d'autres substrats,

et notamment un composé analogue de la L-arginine, l'homo-L-arginine.

**[0012]** Dans le cadre de cette nouvelle approche cosmétique, l'application topique de l'actif a aussi été prise en compte, ce qui soulève la question de sa biodisponibilité c'est à dire sa capacité à agir sur sa cible biologique principale : l'adipocyte.

Ce type de cellule n'est effectivement pas localisé à proximité immédiate du site d'application de l'actif, mais dans une couche profonde de la peau, l'hypoderme.

**[0013]** C'est pourquoi un but important de l'invention est d'augmenter la biodisponibilité de l'actif cosmétique selon l'invention.

**[0014]** Une des caractéristiques de la composition cosmétique selon l'invention est donc de réduire la dégradation (par les arginases) ou la métabolisation de la L-arginine (ou de son analogue) par les couches supérieures de la peau, ou encore d'améliorer la pénétration cutanée de la L-arginine ou de son analogue.

**[0015]** La NO-synthase est également présente dans les cellules des couches supérieures de la peau telles que les kératinocytes et les fibroblastes.

**[0016]** Une autre caractéristique de l'invention est donc également d'éviter d'éventuels effets secondaires indésirables pouvant résulter de la production de NO<sup>o</sup> par les couches supérieures de la peau.

**[0017]** Une conséquence positive de la présence de NO-synthase dans les couches supérieures de la peau est que la composition lipolytique à base de précurseur de NO<sup>o</sup> sera capable de produire un signal lipolytique qui pourra être transmis vers une couche plus profonde, telle que l'hypoderme.

**[0018]** De plus, les cellules endothéliales, qui forment la paroi des microvaisseaux irriguant le derme et l'hypoderme, possèdent également des NO-synthases et peuvent donc participer à l'effet lipolytique.

Elles peuvent également contribuer à la diminution des surcharges adipeuses par un mécanisme particulier : le NO produit peut en effet induire une vasodilatation qui va favoriser le drainage du tissu adipeux.

**[0019]** Enfin, un mode d'action possible du radical NO<sup>o</sup>, suggéré par des résultats expérimentaux très récents, pourrait provenir de sa capacité à s'opposer à la multiplication des préadipocytes, des cellules précurseurs qui vont se différencier en adipocytes matures capables de stocker les graisses. Cette propriété pourrait ainsi s'opposer très efficacement à l'augmentation du tissu adipeux.

**[0020]** L'objet de la présente invention est donc de proposer l'utilisation de la L-arginine, d'un analogue de la L-arginine, ou d'un de leurs dérivés (ou l'un quelconque de leurs sels) agissant comme précurseur endogène de NO<sup>o</sup>, dans des compositions cosmétiques pour l'amincissement administrables par voie topique.

#### Description détaillée de l'invention :

**[0021]** Jusqu'à ce jour, aucune utilisation de la L-arginine, ou d'un analogue de L-arginine précurseur de NO<sup>o</sup>, ou d'un de leurs dérivés, n'a été revendiquée pour l'amincissement.

**[0022]** Le brevet FR-A-2.758.724 propose une composition destinée à lutter contre la cellulite et les surcharges adipeuses à base de protamine, protéine contenant entre autre de l'arginine. La protamine aurait une action inhibitrice de la captation des acides gras libres par l'adipocyte dans le tissu adipeux sous-cutané. La protamine agirait donc par inhibition de la lipogenèse, ce qui n'est pas l'effet revendiqué dans la présente invention.

**[0023]** L'arginine est également utilisée dans le brevet FR-A-2.745.498 qui décrit une composition thérapeutique associant de l'arginine et du silicium utilisée dans le cadre d'un régime hyperprotéiné hypocalorique. Cette composition administrable par voie orale a pour but d'améliorer l'efficacité d'une diète protéinée grâce à l'activité lipolytique du silicium et d'en éviter les effets secondaires sur la fonction rénale grâce à l'arginine.

Le brevet EP-A-0.281.435 décrit un produit thérapeutique consistant en un complexe de silanol et d'acide aminé, ledit produit convenant à la préparation de médicaments régulateurs et activateurs du métabolisme, de la croissance et de la multiplication de certaines cellules. L'agent actif est le silanol, dont l'activité biologique est améliorée par la complexation avec un acide aminé naturel pouvant être la L-arginine.

**[0024]** Enfin, à notre connaissance, l'utilisation de la L-arginine comme précurseur de NO<sup>o</sup> a déjà été décrite (Cordeiro P.G., Santamaria E, Hu Q.Y. "Use of a nitric oxide precursor to protect pig myocutaneous flaps from ischemia-reperfusion injury" - Plastic & Reconstructive surgery, vol. 102, (1998) n°6, pp. 2040-2048), mais il s'agissait de protéger les tissus du stress oxydatif.

**[0025]** La présente invention a donc pour objet une composition cosmétique pour l'amincissement comprenant, en association avec tout excipient cosmétiquement approprié, au moins un composé qui est la L-arginine, un analogue de la L-arginine ou l'un de leur dérivés, ou l'un quelconque de leurs sels, ledit composé ayant la formule générale suivante :



15

20

25

30

35

40

45

50

55

BNSDOCID: <EP\_\_1060739A1 | >

tamique, acide pyro-glutamique, acide aspartique, glutamine, arginine, histidine, lysine.

**[0035]** De préférence, l'acide aminé est l'alanine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, le tryptophane ou la valine qui sont des acides aminés hydrophobes permettant de renforcer la lipophilie du composé, afin d'augmenter son affinité pour la peau.

**[0036]** Lorsque le radical  $R_2$  est un acide aminé, il est préférable de substituer sa fonction  $\alpha$ -carboxylique libre et/ou la fonction  $\alpha$ -aminée libre de l'acide aminé  $R_1$  de façon à rendre cette fonction non ionisable à pH physiologique.

De préférence, ces fonctions sont substituées par les groupements cités précédemment.

**[0037]** Comme on l'a dit, un but important de l'invention est de proposer un précurseur de  $NO^\circ$ , la L-arginine ou son analogue, dont la biodisponibilité est compatible avec une action sur l'hypoderme, une couche profonde de la peau.

**[0038]** Il est donc utile de réaliser un composé ayant une forme propre à éviter qu'il ne soit métabolisé dans les couches supérieures de la peau avant d'avoir atteint l'hypoderme.

**[0039]** Ceci est obtenu en première intention lors de la substitution des fonctions  $\alpha$ -carboxylique et  $\alpha$ -aminée de la L-arginine. En effet, ces formes sont biologiquement inactives (concept de prodrogue) et n'entreront donc pas dans les voies métaboliques utilisant cet acide aminé.

**[0040]** Ces formes ne sont notamment pas substrat des NO-synthases (Hrabak A, Bajor T, Temesi A "Comparison of substrate and inhibitor specificity of arginase and nitric oxide (NO) synthase for arginine analogues and related compounds in murine and rat macrophages" - Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 198, (1994) pp. 206-212).

**[0041]** Cette résistance à la "désactivation enzymatique" par les couches supérieures de la peau sera encore renforcée lorsque le substituant  $R_1$  et/ou le substituant  $R_2$  porte un radical stériquement encombrant.

**[0042]** Ainsi, lorsque  $R_1$  est un radical acyloxy et/ou  $R_2$  est un radical alcoxy ou alkylamine, la chaîne alkyle portée par ces radicaux peut être un groupement isopropyle, isobutyle, secbutyle ou tertibutyle.

De même, lorsque  $R_1$  et/ou  $R_2$  est un acide aminé, celui-ci est choisi parmi les acides aminés possédant une chaîne latérale encombrante tels que la valine, la leucine ou l'isoleucine.

**[0043]** Selon un autre mode de réalisation permettant d'augmenter la résistance à la dégradation enzymatique du composé (I), les radicaux  $R_1$  et/ou  $R_2$  sont choisis parmi des acides aminés substrats d'enzymes spécifiques de manière à rendre ledit composé moins sensible à la désactivation enzymatique lors de son passage dans les couches supérieures de la peau.

De tels acides aminés peuvent être la citrulline, l'homosérine, la norvaline, l'ornithine, la pénicillamine ou la sarcosine. Selon ce mode de réalisation, un composé particulièrement intéressant est le dipeptide naturel L-citrullinyl-L-arginine ( $R_1$  = citrulline et  $R_2$  = OH) produit par une algue rouge (*Chondrus crispus*).

**[0044]** Un objectif particulièrement important de l'invention est de proposer un précurseur de  $NO^\circ$  qui ne provoque pas d'effet secondaire gênant, ce qui est inacceptable pour un actif cosmétique.

**[0045]** Ainsi, comme on l'a précisé, la composition cosmétique objet de l'invention est conçue de façon à éviter la production de  $NO^\circ$  par les cellules des couches supérieures de la peau.

Les kératinocytes ou les fibroblastes ne possèdent normalement qu'une forme de NO-synthase dite "constitutive" qui ne produit le  $NO^\circ$  qu'en très faibles quantités (quantités compatibles avec le rôle de messenger cellulaire de  $NO^\circ$ ), et uniquement en réponse à des stimuli très spécifiques.

Toutefois ces cellules, dans certaines conditions pathologiques (inflammation notamment), peuvent exprimer des formes dites "inductibles" de NO-synthases à même de produire des quantités plus importantes de  $NO^\circ$ .

**[0046]** Dans ce contexte un mode de réalisation particulier de l'invention vise à s'opposer à un sous-produit toxique du radical  $NO^\circ$ , l'acide peroxy-nitrique ( $HOONO$ ), qui peut être produit lorsque la peau est soumise à un stress oxydatif et dont la toxicité est renforcée en présence de métaux de transition.

Le principe consiste à condenser le précurseur de  $NO^\circ$  sur une molécule à même de s'opposer à la toxicité de l'acide peroxy-nitrique, qui sera libérée lors de la "bioactivation" par les enzymes cutanés.

**[0047]** Selon ce mode de réalisation particulier de l'invention, on condense sur la L-arginine ou son analogue un substituant  $R_1$  ou  $R_2$  biodégradable possédant une fonction thiol (SH) ou thioéther. En effet, l'atome de soufre confère la possibilité de fixer les ions métalliques qui participent à la formation d'espèces cytotoxiques dérivées du radical  $NO^\circ$ , et par conséquent de les neutraliser.

**[0048]** On sait par ailleurs qu'*in vivo* les acides aminés possédant un groupement thiol, et en particulier la cystéine, constituent une cible privilégiée de l'acide peroxy-nitrique.

**[0049]** On condensera donc avantageusement sur la L-arginine ou son analogue les acides aminés possédant une fonction thiol choisis parmi la L-cystéine, la N-acétyl-cystéine la L-méthionine ou la pénicillamine.

**[0050]** D'autres acides aminés conviennent également pour éviter d'éventuels effets secondaires dus à la formation d'acide peroxy-nitrique, et en particulier la L-histidine qui possède un noyau imidazole lui conférant la propriété de piéger les radicaux libres pouvant être générés par l'acide peroxy-nitrique (décomposition homolytique pour former  $OH^\circ$  et  $NO^\circ$ ). De plus, L-histidine est connue pour ses propriétés de chélation des métaux de transition qui catalysent les réactions toxiques associées à l'acide peroxy-nitrique.

**[0051]** On peut aussi choisir avantageusement l'acide glutamique ou l'acide aspartique dont les fonctions  $\alpha$ -carboxy-

liques confèrent des propriétés de chélation des métaux de transition.

[0052] Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent avantageusement contenir au moins un composé aux propriétés anti-oxydantes de façon à neutraliser les radicaux libres pouvant être générés par l'acide peroxyntreux, et à réparer les dommages causés par cette espèce (agent peroxydant des membranes cellulaires).

De préférence, ce composé anti-oxydant est un pseudodipeptide du type de ceux obtenus par couplage de l'histamine et d'un acide aminé, commercialisés par la demanderesse et décrits dans la demande de brevet internationale WO94/19325.

[0053] Un mode particulier de réalisation de l'invention consiste à obtenir une composition contenant un précurseur permettant la synthèse endogène de NO<sup>o</sup> tout en modifiant favorablement le "statut redox" du tissu adipeux.

En effet, selon Gaudiot et coll., l'activité lipolytique du monoxyde d'azote est modulée par son état redox (NO<sup>o</sup>, NO<sup>+</sup> ou NO<sup>-</sup>), il est particulièrement approprié de créer un état redox (tissulaire ou intracellulaire) qui va optimiser l'activité lipolytique de ce messager.

[0054] Ceci peut être obtenu en associant au composé de formule générale (I) un anti-oxydant tel que la vitamine E (et autres tocophérols apparentés), la vitamine C (acide ascorbique et dérivés) ou un pseudodipeptide du type de ceux mentionnés précédemment.

On peut aussi avantageusement condenser sur la L-arginine ou son analogue un composé présentant des propriétés antioxydantes. Certains de ces composés tels que les aminoacides ont déjà été mentionnés mais la cystéine et préféablement la N-acétyl-cystéine sont particulièrement indiqués dans la mesure où leur activité sur le statut redox des cellules a été décrit.

[0055] D'autre part, lorsque le composé de formule générale (I) est le monométhylsilanetriol de L-arginine, le monométhyl silanetriol produit lors de l'hydrolyse du composé, peut lui aussi moduler le statut redox cellulaire de façon à potentialiser l'effet lipolytique.

[0056] Enfin, dans la mesure où l'objet de l'invention consiste à apporter à la peau un substrat de la NO-synthase propre à induire la formation endogène de NO, tout additif favorisant l'activité de cette enzyme pourra s'inscrire dans cette approche.

[0057] Il a été démontré que les composés portant une fonction thiol réduite étaient nécessaires pour une activité maximale de l'enzyme.

C'est pourquoi la cystéine et d'autres composés comprenant une fonction thiol seront des additifs préférés.

[0058] On peut citer le NADPH, un cofacteur nécessaire à l'activité de l'enzyme, qui est consommé lors de la formation du NO.

Toute substance pouvant contribuer à augmenter le taux de NADPH dans les cellules cutanées pourra donc favoriser un effet lipolytique NO-dépendant.

[0059] De même, le calcium ou toute substance pouvant augmenter le taux de calcium intracellulaire (cet élément est également un cofacteur de l'enzyme).

A ce titre, le monométhyl silanetriol de L-arginine est un des composés indiqués, dans la mesure où le monométhyl silanetriol peut favoriser l'apport de calcium aux cellules (traitement de l'ostéoporose).

[0061] Les composés de formule générale (I) peuvent être préparés suivant des méthodes connues de l'homme du métier.

[0062] Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent être utilisées sous différentes formes compatibles en cosmétique c'est à dire sous forme de solution, d'émulsion ou de dispersion, sous forme de liposomes, microparticules ou nanoparticules ou encore sur des matrices de polymères organiques, de silice ou autres supports minéraux. On choisira de préférence des formes propres à favoriser la pénétration intradermale telles que les microémulsions, les liposomes ou encore l'Emulzome®, microdispersion fluide de corps gras/eau commercialisée par la demanderesse, qui présente une bioaffinité élevée pour la peau.

[0063] Les compositions selon l'invention peuvent se présenter sous toute forme cosmétiquement appropriée, et notamment sous toutes les formes appropriées à un usage topique : crème, lait, lotion, gel, spray, patch.

Tous les additifs et excipients couramment utilisés dans l'industrie cosmétique peuvent être employés pour réaliser l'invention pourvu qu'ils soient compatibles avec le composé de formule générale (I).


Parmi ces additifs et excipients, on peut citer le Transcutol® (éther monométhylglycol), l'a-Bisabolol, l'acide oléique ou encore l'urée qui, en plus de leurs propriétés spécifiques, favorisent la pénétration cutanée.

[0064] Les exemples qui suivent illustrent de façon non limitative les compositions cosmétiques selon l'invention.



[0065] Exemples de structures :

N-acétyl-L-arginine

Monométhylsilanetriol de L-arginine



N-acétyl-L-cystéinyl-L-arginine éthyylester



L-arginylpivalloyloxyméthylester

## Exemple 1 : Emulsion fluide (microdispersion huile dans l'eau)

Sepigel 305® (Polyacrylamide, C13-14 isoparaffine, Laureth-7)  
 triglycérides d'acides caprique et caprilique  
 myristate d'isopropyle  
 diheptanoate de néopentyl glycol

4,00 g  
 5,00 g  
 5,00 g  
 2,00 g

# EP 1 060 739 A1

(suite)

Exemple 1 : Emulsion fluide (microdispersion huile dans l'eau)		
5	glycérine ( glycérol)	5,00 g
	polyisobutène hydrogéné	2,15 g
	cyclométhicone	0,60 g
	heptanoate de stéaryle	1,43 g
	imidazolidinyl urée	0,30 g
10	phénoxyéthanol	0,20 g
	Monométhylsilanetriol de L-arginine	4,00 g
	ALISTIN® (solution hydroglycolique de carcinine chlorhydrate à 10%)	0,20 g
	α-bisabolol	0,50 g
	EDTA disodique	0,10 g
15	Eau qsp	100,00 g

Exemple 2 : Gel glycolique		
20	Carbomer	0,50 g
	Transcutol® (éthoxydiglycol)	2,00 g
	Propylène glycol	1,00 g
	Sorbitol	1,00 g
	Oleth-20	1,50 g
25	Phénoxy éthanol	0,50 g
	N-acétyl-L-arginine	5 g
	Solution hydroglycolique de L-pyroglyutamylhistamine à 10%	0,20 g
	urée	3,00 g
30	EDTA disodique	0,10 g
	Hydroxyde de sodium	0,10 g
	Eau qsp	100,00 g

Exemple 3 : Crème amincissante		
35	Sepigel 305® (Polyacrylamide, C <sub>13-14</sub> isoparaffin, Laureth 7)	2,00 g
	imidazolidinyl urée	0,30 g
	parahydroxybenzoate de méthyle sodé	0,10 g
40	parahydroxybenzoate de propyle	0,05 g
	N-acétyl-L-cystéinyl-L-arginine éthylester	4,70 g
	Tegocare 150 (stéarate de glycéryle, stéareth-25, céteth-20, alcool stéarylique)	10 g
	octanoate de cétéaryle	10,00 g
45	huile de macadamia	10,00 g
	diméthicone copolyol	0,30 g
	diméthicone	0,20 g
	glycérine	3,00 g
	acide oléique	1,00 g
50	Eau qsp	100,00 g

Exemple 4: Lait amincissant		
55	Sepigel 501® (copolymères d'acrylamide, huile de paraffine, polysorbate-85)	2,00 g
	isononanoate d'octyle	2,00 g
	diméthicone copolyol	0,50 g



(suite)

Exemple 4: Lait amincissant		
	cétéaryl glucoside	0,80 g
5	polyisobutène hydrogéné	0,54 g
	cyclométhicone	0,15 g
	heptanoate de stéaryle	0,36 g
	imidazolidinyl urée	0,20 g
10	phénoxyéthanol	0,30 g
	L-arginylpivalloyloxyméthylester	3,50 g
	urée	1,50 g
	Eau qsp	100,00 g

#### Exemple 5 : Etude comparative de la diffusion cutanée

**[0066]** Des rats hairless sont sacrifiés par injection intracardiaque de pentobarbital ; la peau ventrale est récupérée et l'hypoderme est enlevé au scalpel.

0,2 ml par cm<sup>2</sup> de solution à tester sont déposés sur un morceau de peau (derme et épiderme) qui est ensuite monté sur une cellule de diffusion. La diffusion est réalisée contre du tampon phosphate contenant 0,5 % de tween 20.

A différents temps, le tampon phosphate est remplacé et l'arginine est dosée par HPLC dans les fractions de dialysat récupérées.

Produits testés (solution à 30 mM)	% de diffusion après 5h
L-Arginine	15
Monométhylsilanetriol de L-arginine	42
N-acétyl L-arginine	47
N-acétyl-L-cystéinyl-L-arginine méthylester	61
L-arginylpivalloyloxyméthylester	51

#### Exemple 6 : Activité lipolytique *in vitro*

**[0067]** On teste l'activité lipolytique *in vitro* de solutions contenant des composés selon l'invention à 4%.

Le témoin négatif est la solution qui sert à diluer les actifs (NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> 0,01 M).

Le témoin positif est la caféine à 1,5 g/l.

**[0068]** Des segments de tissu adipeux périrénal de lapins mâles sont incubés dans un tampon Krebs-Ringer bicarbonate, pH 7,4, qui contient 5,5 mM glucose, 40 mg/ml de sérum albumine bovin. Le volume total d'incubation est de 3 ml avec les substances à tester préparées dans 0,01 M NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> et additionné dans un volume de 0,1 ml. Les préparations sont placées sous agitation à 37°C, sous une atmosphère à 95 % O<sub>2</sub>, 5 % CO<sub>2</sub>.

**[0069]** Les taux d'activité lipolytiques sont quantifiés par la libération du glycérol dans le milieu d'incubation et sont exprimés par gramme de lipide. Le glycérol est dosé en duplicata par la méthode enzymatique : glycérokinase, glycérophosphate deshydrogénase (Boehringer-Mannheim), méthode de Wieland (32), modifiée par Vaughan (33).

Résultats:	
	Glycérol (nmoles/g de lipides)
Témoin	0,75±0,3
Monométhylsilanetriol de L-arginine 15 mg/l	1±0,5
Monométhylsilanetriol de L-arginine 30 mg/l	2,40±0,35
Monométhylsilanetriol de L-arginine 45 mg/l	2,5±0,35
Caféine 1,5g/l	1,45±0,25

#### Exemple 7: test *in vivo* sur rats

**[0070]** Trois lots de 4 rats ZUCKER *fa/fa* définis de manière homogène ont été intégrés dans l'animalerie à 8 semaines. L'expérimentation débute lorsque les rats ont atteint 9 semaines et des poids comparables (240 ± 15 g) ; ils sont

5

10

15

## 40

- 45



55

$R_1$  représente un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un radical acyle, acyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -aminée libre, lié par une liaison peptidique,

$R_2$  représente un groupement hydroxyle, un radical alcoxy, amine, alkylamine, un groupement silyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -carboxylique, lié par une liaison peptidique,

et  $n = 3$  ou 4


2. Composition cosmétique selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit composé de formule générale (I) est tel que :

$R_1$  représente un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un radical acyle, acyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -aminée libre, lié par une liaison peptidique,

$R_2$  représente un groupement hydroxyle, un radical alcoxy, amine, alkylamine, un groupement silyloxy ou un aminoacide substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -carboxylique, lié par une liaison peptidique,

et  $n = 3$

3. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que  $R_2$  représente un groupement silyloxy ayant la formule générale suivante:



dans laquelle  $R_3$  représente un groupement alkyle.

4. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ledit composé de formule (I) est le monométhyl silanetriol de L-arginine.

5. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit composé de formule (I) est tel que  $R_1$  et/ou  $R_2$  est un acide aminé substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -amine ou  $\alpha$ -carboxylique, choisi parmi les aminoacides suivants : alanine, cystéine, glycine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, méthionine, phénylalanine, proline, hydroxyproline, sérine, thréonine, tryptophane, asparagine, valine, acide aspartique, acide glutamique, acide pyroglutamique, glutamine, arginine, histidine, lysine.

6. Composition cosmétique selon la revendication 5, caractérisée en ce que ledit composé de formule générale (I) est tel que  $R_1$  et/ou  $R_2$  est l'alanine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, le tryptophane ou la valine.

7. Composition cosmétique selon la revendication 5 caractérisée en ce que ledit composé de formule générale (I) est tel que  $R_1$  et/ou  $R_2$  est la méthionine, la cystéine, l'histidine, l'acide aspartique ou l'acide glutamique.

8. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisée, en ce que ledit composé de formule (I) est tel que  $R_1$  et/ou  $R_2$  représente un acide aminé substitué ou non sur sa fonction  $\alpha$ -amine ou  $\alpha$ -carboxylique choisi parmi les aminoacides suivants : citrulline, homosérine, norvaline, ornithine, pénicillamine ou sarcosine.

9. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit composé de formule (I) est tel que  $R_1$  est un radical acyl ou acyloxy portant un groupement isopropyle, sec-butyle, tert-butyle, isobutyle et/ou  $R_2$  est un radical alcoxy ou alkylamine portant un groupement isopropyle, n-butyle, sec-butyle, tert-butyle, isobutyle, n-octyle ou pivaloyloxyméthyle.

10. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un antioxydant tel que la vitamine E, l'acide ascorbique ou leurs dérivés, ou un aminoacide possédant un groupement thiol tel que la N-acétyl-cystéine.

11. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un pseudopeptide du type de ceux obtenus par couplage de l'histamine et d'un acide aminé.

**EP 1 060 739 A1**

12. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en outre un activateur de NO-synthase tel que le NADPH, le calcium ou toute substance propre à augmenter le taux de calcium intracellulaire.

5 13. Composition cosmétique selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée en ce qu'elle se présente sous toute forme couramment employée en cosmétique à savoir crème, lait, lotion, gel, patch ou spray.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 00 48 0049

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	FR 958 M (A.E.C. SOCIETE DE CHIMIE ORGANIQUE ET BIOLOGIQUE) * le document en entier *	1-13	A61K7/48
A,D	FR 2 745 498 A (GIROUX) 5 septembre 1997 (1997-09-05) * le document en entier *	1-13	
A	GB 2 199 243 A (NATURAL VITALITY LIMITED) 6 juillet 1988 (1988-07-06) * le document en entier *	1-13	
A	DE 43 41 001 A (BEIERSDORF) 8 juin 1995 (1995-06-08) * le document en entier *	1-13	
A,D	FR 2 758 724 A (JAVENECH) 31 juillet 1998 (1998-07-31) * le document en entier *	1-13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			A61K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche <b>LA HAYE</b>		Date d'achèvement de la recherche <b>6 octobre 2000</b>	Examineur <b>Fischer, J.P.</b>
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : antérie-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C02)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 48 0049

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

06-10-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 958 M		AUCUN	
FR 2745498 A	05-09-1997	AUCUN	
GB 2199243 A	06-07-1988	AU 7969187 A EP 0506653 A WO 8801865 A	07-04-1988 07-10-1992 24-03-1988
DE 4341001 A	08-06-1995	WO 9515148 A EP 0802783 A JP 9505823 T	08-06-1995 29-10-1997 10-06-1997
FR 2758724 A	31-07-1998	AUCUN	

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**